

УДК 581.9

**ROSA GLABRIFOLIA C.A. MEYER EX RUPR.
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ПРИВОЛЖСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ**

А.А. Хапугин, Т.Б. Силаева, И.О. Бузунова

В статье приводятся результаты критического обобщения распространения вида *Rosa glabrifolia* C.A. Mey. ex Rupr. в северо-западной части Приволжской возвышенности. В пределах этого района расположены фрагменты пяти субъектов Российской Федерации: Республик Чувашская и Мордовия, Пензенской, Нижегородской и Ульяновской областей. На этой территории располагаются бассейны трех крупных рек – Суры, Мокши (верхнее и среднее течение) и Хопра (верхнее течение).

Ключевые слова:

Khapugin A.A., Silayeva T.B., Buzunova I.O. ROSA GLABRIFOLIA C. A. MEYER EX RUPRECHTII NORTHWESTERN VOLGA UPLANDS - The article presents the results of the critical analysis of the spread of *Rosa glabrifolia* C.A. Mey. ex Rupr. in the northwestern part of the Volga-shennosti lift up. Within this district there are fragments of the five subjects of the Russian Federation: the Republic of Mordovia and Chuvashia, Penza, Nizhegorodov-ray and Ulyanovsk regions. This territory has a pool of three major rivers - the Sura, Moksha (upper and middle reaches) and Khoper (high flow-tion).

Key words: *Rosa glabrifolia* C.A. Mey. ex Rupr.

Rosa glabrifolia C. A. Mey. ex Rupr. [incl. *R. pratorum* Sukacz.] – шиповник гололистный – относится к секции *Cinnamomeae* DC. рода *Rosa* L. семейства *Rosaceae* Adans (Бузунова, 2001). Во «Флоре...» П.Ф. Маевского (1964) этот вид рассматривался как вариация шиповника майского (sub nom. *Rosa majalis* Herrm. var. *glabrifolia* C. A. Mey. ex Rupr.). Поэтому распространение шиповника гололистного в этот период установить сложно.

Накопление материала по этому виду способствовало признанию шиповника гололистного как самостоятельного вида – *Rosa glabrifolia* C. A. Meyer ex Ruprecht. Кроме того, в 2004 г. И.О. Бузуновой в качестве разновидности шиповника гололистного был признан шиповник пушистый (sub nom. *R. glabrifolia* C. A. Mey. ex Rupr. var. *pubescens* Buzunova et Kamelin var. nova = *R. pratorum* Sukacz.) (Бузунова, Камелин, 2004) и тем самым сборы, определенные ранее как шиповник луговой (*R. pratorum* Sukacz.), должны рассматриваться как находки шиповника гололистного.

Шиповник гололистный встречается в осветленных лесах, на лесных полянах и опушках, на склонах, в речных поймах, нередко культивируется. Очень часто встречается совместно с близким ему видом *R. cinnamomea* L., особенно по поймам средних и крупных рек (Сосудистые растения..., 2010). В отличие от последнего, *R. glabrifolia* не встречается в лесных сообществах, за исключением опушек и лесных полян.

Гербарные сборы в Пензенской области имеются из следующих районов: **Башимаковский** (в 1,5 км западнее с. Глебовка, по обочине трассы, 1.08.2010, А. Агеева, Е. Варгот – GMU), **Белинский** (в 2 км юго-восточнее с. Поим, близ автомагистраль через р. Ворона (в зарослях кустарников), 16.06.2003, В. Васюков, М. Куликовский, det. В. Васюков – РКМ), **Лунинский** (Большевыяский бор, у дороги на Владимировку, сосно-

© 2011 Хапугин Анатолий Александрович, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, г. Саранск, Мордовский государственный природный заповедник им. П.Г. Смирнова, пос. Пушта

© 2011 Силаева Татьяна Борисовна, доктор биологических наук, профессор, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, г. Саранск, e-mail: silaeva@yandex.ru

© 2011 Ирина Олеговна Бузунова, кандидат биологических наук, Ботанический институт им. Л.В. Комарова РАН, г. Санкт-Петербург

Поступила 12.03.2011

вый лес, 11.06.2007, Т. Силаева, И. Кирюхин, det. А. Хапугин – GMU), **Никольский** (окрестности с. Кенчурка, остепненная опушка сосново-лиственного леса в основании гряды холмов, 12.06.2008, Т. Силаева, И. Кирюхин, Е. Варгот, Ю. Филатова, det. А. Хапугин – GMU) и **Сердобский** (окрестности с. Байка, по склону оврага Грязнуха, 6.07.2002, Т. Разживина, det. В. Васюков, 2004 – РКМ).

Для Ульяновской области был указан в 1994 г. в «Конспекте флоры... Ульяновской области» (Благовещенский, Раков, 1994) для меловых склонов **Николаевского** района. Позднее был обнаружен в следующих районах: **Инзенский** (в 4 км западнее с. Дракино, на высоком карбонатно-каменистом степном склоне, 5.07.2004, Т. Силаева, А. Гельвих, Е. Письмаркина, det. И. Бузунова), **Вешкаймский** (северо-восточнее с. Каргино, на песчано-карбонатно-каменистом склоне к р. Барыш, 27.07.2005, Т. Силаева, Е. Письмаркина, М. Фадеева, det. И. Бузунова) (все – GMU).

На территории Нижегородской области *Rosa glabrifolia* известна из 18 районов, откуда имеются гербарные сборы: **Большеболдинский** (окрестности с. Свирино, остепненные склоны долины р. Пьяна, 29.08.2005, Т. Силаева, И. Кирюхин, Е. Письмаркина, Е. Варгот, det. И. Бузунова; близ д. Ниловка, склон долины р. Пьяна, 29.08.2005, Т. Силаева, И. Кирюхин, Е. Письмаркина, Е. Варгот, det. И. Бузунова) (все – GMU), **Большемурашкинский** (около д. Салово, по направлению к Воронину, около дороги, 18.06.1927, Н. Арикешева), **Борский** (заливные луга с. Бор, около Муромского затона на северо-западе от пристани, 6.07.1927, С. Станков, Ф. Леви, det. С. Сиднева), **Бутурлинский** (в 4 км от Бутурлино, на южном склоне оврага Провалиха, 10.06.1950, Яковлева), **Ветлужский** (около хутора Тюреха при переезде через речку, в ивовых кустах, 8.07.1928, С. Станков, Ф. Леви, det. С. Сиднева; на берегу р. Юрьевка близ г. Ветлуга, 5.08.1931, З. Тихонова), **Воскресенский** (против с. Благовещенское, по берегу р. Ветлуга, 6.07.1928, В. Алехин, М. Хомутова), **Гагинский** (лес «Мухина гора», правый берег р. Пьяна в 5 км вниз по течению от с. Ветошкино, 9.07.1939, Зарецкая, Кондратьева, Букина), **Городецкий** (д. Ляпуново, смешанный лиственный лес, 21.07.1923, О. Шмагина), **Дальнеконстантиновский** (окрестности с. Мухоедово и Мухоедовского поселка, сосновый лес, 3.07.1928, Н. Рожина), **Краснобаковский** (лес на левом берегу р. Ветлуга, 19.07.1928, Н. Кац, Л. Скворцова), **Кстовский** (мелкая осина, по песчаным буграм, рядом с поймой в 6–7 верстах от д. Борок, к западу от деревни, VI.1925, Е. Куклина; близ Тугаринского хутора, 21.06.1925, Войцелевич, Ильфонд; против с. Великий Враг, левый берег р. Волга, Зименковский фито-экологический луговой участок, прирусловая пойма, 29.06.1926, А. Володина; высокий луг правого берега р. Озерки в районе опытной станции «Родник», против с. Вередеево, 12.07.1926, И. Чернышева; поемный лес по правому берегу р. Кудьма в районе опытной станции «Родник», по дороге в д. Толстобино, близ дороги, 19.07.1927, И. Чернышева; центральная сложная пойма Волги против с. Работки, 12.08.1927, А. Горшунов), **Лысковский** (на берегу р. Керженец, близ кордона Пенякша, 14.08.1928, А. Уранов), **Нижегородский** (центральная пойма Волги против г. Нижний Новгород, по гриве у озера, 15.06.1934, Т. Раевская), **Перевозский** (к востоку от с. Ичалки, в Лебяжьем долу участка «Бор», 2.08.1935, А. Смирнова), **Пильненский** (окрестности совхоза «Прогресс», подлесок дубового леса, сырое место, 4.06.1926, Н. Винокуров), **Починковский** (кустарники по склону р. Рудня у с. Усад, 30.06.1925, Ф. Ненюков; окрестности д. Кочкурово, пойма р. Алатырь, притеррасье, 12.06.1930, С. Сиднева), **Сергачский** (окрестности г. Сергач, пойма р. Пьяна, 1.06.1902, И. Цветков; с. Чуфарово, 1906, неизвестный коллектор; между с. Игнатово и с. Яковлевское, поемные дубняки, 17.06.1927, В. Алехин, Д. Аверкиев), **Сосновский** (Венецкое л-во, Венецкая дача, кв. 125, елово-ольховая заросль по берегу речки Чара, 12.07.1928, С. Сиднева) (все – NNSU).

На территории Республики Мордовия шиповник гололистный известен из 17 районов, откуда существуют гербарные сборы: **Ардатовский** (в 3 км северо-западнее с. Спасские Мурзы, опушка широколиственного леса по берегу оврага, 17.08.2006, И. Кирюхин, Г. Чугунов, Е. Варгот, det. А. Хапугин), **Атяшевский** (в 2 км западнее-северо-западнее с. Дюрки, на южном склоне по краю лиственного леса, 28.06.2004, Т. Силаева, Е. Письмаркина, О. Кузьминова, Г. Левина, det. И. Бузунова), **Большеберезниковский** (в 11 км южнее с. Симкино, песчаный бугор в пойме р. Черменей, 4.07.2005, В. Абрамова, Н. Куликова, det. И. Бузунова), **Большеигнатовский** (с. Новая Александровка, ул. Советская, 8.08.2009, А. Хапугин, Г. Чугунов, С.

Большаков, А. Ботов, det. А. Хапугин), **Дубенский** (в 4 км юго-восточнее с. Кабаево, на высоком травянистом склоне, 15.07.2004, Т. Силаева, Е. Письмаркина, А. Агеева, det. И. Бузунова), **Инсарский** (г. Инсар, широколиственный лес около пос. Заря, 11.06.2005, Е. Письмаркина, И. Кирюхин, det. А. Хапугин) (все – GMU), **Ичалковский** (окрестности с. Ичалки в 2 верстах от Смольного кордона, в сосновом лесу, 17.06.1926, А. Назарова; конопляные посевы с. Оброчное, на меже, 12.06.1930, С. Сиднева; берег р. Инсар у д. Нагорная Пуза, 14.06.1930, С. Сиднева (все – NNSU); НП «Смольный», пойма левого берега р. Алатырь в 0,9 км северо-восточнее с. Ташкино, 13.08.2010, А. Хапугин), **Кадошкинский** (в 4-х км восточнее с. Глушково, урочище Пектелевка, 29.06.2005, А. Агеева, Е. Письмаркина, И. Матвиенко), **Лямбирский** (близ границы с Ромодановским районом, залежь в 0,7 км северо-восточнее с. Еремеево, 8.08.2010, А. Хапугин), **Ромодановский** (в 2–3 км западнее с. Салма, обочина лесной дороги, 25.06.2009, А. Хапугин), **Рузаевский** (с. Палаевка, обочина шоссе на с. Урледим, 18.08.2009, А. Хапугин, Д. Курмаева, А. Карпухина), **Саранский** (Среди огородов на южном склоне между юго-западным районом и пос. Николаевка, 16.06.2005, Е. Письмаркина, М. Самарина) (все – GMU), **Старошайговский** (окрестности с. Старое Шайгово, на крутом открытом склоне, 6.06.2007, Т. Силаева, А. Лапшин, det. А. Хапугин) (все – GMU), **Темниковский** (Мордовский государственный заповедник им. П. Г. Смидовича, кв. 324, пойма р. Пушта, 2.07.1979, Л. Медведева – ГМГПЗ; правый берег р. Мокша в 3 км ниже г. Темникова, С. Майоров, Т. Рахимов, Л. Сухова – MW), **Теньгушевский** (в 1,7 км западнее с. Теньгушево, обочина шоссе близ недостроенного здания аэродрома, 25.06.2010, А. Хапугин, Е. Варгот, А. Агеева), **Торбеевский** (в 3,5 км северо-восточнее пос. Торбеево, урочище Калиновка, 2.07.2005, А. Агеева, И. Матвиенко), **Чамзинский** (в 2 км западнее с. Медаево, степной склон близ пруда, 20.06.2008, Т. Силаева, А. Ивашина, Г. Левина, А. Хапугин) (все – GMU).



Рисунок 1 – Местонахождения вида в северо-западной части Приволжской возвышенности. 1 – Рязанская область; 2 – Нижегородская область; 3 – Чувашская Республика; 4 – Республика Мордовия; 5 – Пензенская область; 6 – Ульяновская область. ◆ – местонахождения *Rosa glabrifolia* С. А. Мей. ex Rupr.

По фрагменту Чувашской Республики о *Rosa glabrifolia* мы не имеем сведений, хотя, вероятно, она там встречается.

На территории Рязанской области, лежащей в пределах Окско-Донской низменности, – у западной границы Приволжской возвышенности зарегистрировано несколько местонахождений *Rosa glabrifolia*. Вид зарегистрирован из трех районов: **Ермишский** (обочина дороги близ озера-старицы р. Мокша в 4,5 км западнее с. Нарма, 25.06.2010, А. Хапугин, Е. Варгот, А. Агеева.), **Сасовский** (обочина шоссе близ с. Шевали-Майданы, 26.06.2010, А. Хапугин, А. Агеева) (все – GMU), **Спасский** (территория Окского биосферного природного государственного природного заповедника – LE) (Казакова, 2004).

Все находки *Rosa glabrifolia* приурочены к поймам рек. Реже он встречается по опушкам и вдоль дорог смешанных и лиственных лесов. Часто шиповник гололистный образует кустарниковые заросли вместе с близким ему видом *R. cinnamomea* L. При этом *R. glabrifolia* отличается экологически от более экологически пластичного *Rosa cinnamomea*. Первый вид приурочен лишь к поймам рек, встречается вдоль дорог, реже – по лесным опушкам, просекам, иногда культивируется как декоративный кустарник, но совершенно не встречается в подлеске лесных сообществ. Второй встречается намного чаще и повсеместно – по речным поймам, вдоль дорог, вдоль просек и дорог в лесу, на лесных полянах, в подлеске лесов, так же культивируется в качестве декоративного кустарника. Поэтому *R. glabrifolia* можно характеризовать как лугово-опушечный вид, преимущественно приуроченный к поймам рек.

Как видно из рисунка 1, в области распространения хвойных лесов Нижегородской области и Республики Мордовия имеются лишь единичные находки вида, приуроченные к поймам рек. Небольшое количество сборов в бассейнах р. Мокша и верхнего течения р. Сура связано, на наш взгляд, с недостаточной исследованностью этой территории. Несомненно, при дальнейших полевых исследованиях и просмотре гербарного материала с территории этих регионов будут выявлены новые местонахождения этого вида.

Местонахождения вида в северо-западной части Приволжской возвышенности представлены на рисунке 1.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Благовещенский В.В., Раков Н.С. Конспект флоры высших сосудистых растений Ульяновской области. Ульяновск: Б.И., 1994. 116 с.

Бузунова И.О., Камелин Р.В. Виды рода *Rosa* L. (*Rosaceae*) секции *Cinnamomeae* DC. во флоре Кавказа // Новости систематики высших растений. СПб., 2004. Т. 36. С. 112-122.

Бузунова И.О. Роза, шиповник – *Rosa* L. // Флора Восточной Европы. СПб., Т. 10. 2001. С. 329-361.

Иванина Л.И. *Rosa* L. – Роза, Шиповник // П.Ф. Маевский. Флора средней полосы Европейской части СССР. 9-е изд. / Под общ. ред. Б.Е. Шишкина. Л.: Колос, 1964. С. 133-137.

Казакова М.В. Флора Рязанской области. Рязань: Русское слово, 2004. 388 с.

Сосудистые растения Республики Мордовия (конспект флоры): монография / Под ред. Т.Б. Силаевой. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2010. 352 с.